



EKO PROGRAM ZAŠTITE ORAHA 2023.



Registrirani pripravci u proizvodnji ORAHA

1. Bakreni pripravci : **BORDOŠKA JUHA, CHAMPION, NEORAM , CUPRABLAU Z 35 WG**
(bakterijske bolesti preventivno)
2. Insekticidi : **Laser** (jabučni savijač –povremeni štetnik na lijesci, orahu), **Rotor Super, Decis,Scatto –(lisne uši, ljeskotoč)** kontaktni insekticidi nesigurnog djelovanja (ne djeluju na višim temp od 22-23 ° C, bez rezidualnog djelovanja) **CORAGEN** – (jabučni savijač)
Protiv najvažnijeg štetnika oraha-orahove muhe, u ovom načinu proizvodnje nema adekvatne zaštite!!!
3. **Signum** – siva pjegavost lista (*Gnomonia leptostyla*)
4. Sumporni pripravci: **Chromosul 80, COSSAVET DF, Kumulus DF-** (pepelnica, štetne grinje)
5. Herbicidi : **FUSILLADE FORTE, MIZZUKI, BARBARIAN XTRA 610, GALLUP SUPER 480**

Izuzetno malo registriranih pripravaka sa tendencijom smanjenja postojećeg broja – budućnost zaštite oraha tzv konvencionalnim načinom je vrlo upitna



Orijentacijski program zaštite i gnojidbe

oraha

1. Tretiranje na početku vegetacije (faza bubreњa pupova)

Fertipen C	3,0 l (bakterioze)
Laincoil	10,0 l (zimska jaja štetnika)
ili FitoFilm	1,0 l

2. Tretiranje pred cvatnjem

FitoMil L-60 eco	2,0 l (siva pjegavost lista, <i>Xantomonas</i>)
+ FitoHeliosulfure	2,0-3,0 l (sumpor + prirodni terpeni pinusa)
Grogreen Vegetative	2,0 kg (NPK gnojivo s mikroelementima)
Litoman Ultra	4,0 kg (fizička barijera za štetnike)

U slučaju pojave štetnih gusjenica primijeniti Baturad 1,0 kg/ha.

Bakterioze - primjeniti preventivne preparate za zaštitu pupova, kao i tijekom razdoblja dugotrajne vlažnosti lista. Po potrebi ponoviti 7-10 dana.

3. Cvatnja muških cvjetova, travanj

Litoman Ultra	4,0 kg (preventivno suzbijanje štetnika)
Ekstrasol	2,0 l (suzbijanje bakterijskih bolesti)
Kaishi	2,0 l (aminokiseline)

4. Tretiranje početkom svibnja

Fitomil L-60 eco	2,0 l (siva pjegavost lista, <i>Xantomonas</i>)
+ Fertipen C	1,0 l (siva pjegavost lista, <i>Xantomonas</i>)
Baturad	1,0 kg (orahov savijač)
Litoman Ultra	3,0-5,0 kg (preventivno štetnici, sprječavanje polaganja jaja orahove muhe)

Pratiti pojavu orahove muhe i po potrebi tretman za suzbijanje prilagoditi pojavi muhe.

Pomaknuti ga na početak lipnja ili kraj svibnja.

5. Tretiranje u lipnju

FitoMil L-60 eco	2,5 l (bakterioze)
Kaishi	2,0 l (aminokiseline)
Grogreen Vegetative	2,0 kg (gnojivo u gel formulaciji s visokim sadržajem kalija)
Kaolin	10,0 kg (sprječavanje ožegotina i štetnika)

6. Tretiranje u srpnju	
FitoMil L-60 eco	2,0 l (bakterioze)
FitoAlgen F	2,0 l (aminokiseline)
Ekstrasol	2,0 l (siva pljesan)
Kaolin	10,0 kg
7. Tretiranje nakon berbe	
FitoFol B	2,0 l (bor za bolju oplodnju u narednoj sezoni)
FitoFol Zn	1,0 l (diferencijacija pupova)
Izdvojeni tretman	
Fertipen C	2,0 l (bakterioze)
DODATNE NAPOMENE:	
<ul style="list-style-type: none"> • U slučaju pojave stresnih uvjeta za biljku (mraz, suša, tuča) potrebno je obaviti tretiranje jednim od pripravaka s aminokiselinama radi bržeg oporavka biljke: FitoAlgen F u dozi 2,0 l ili Kaishi u dozi 1,5-2,0 l. • Uz insekticide i akicide obavezno koristiti proizvod pH minus u dozi 0,5 l/ha zbog reguliranja pH vrijednosti škropiva. Snižavanjem pH vrijednosti škropiva postiže se bolje djelovanje insekticida i akaricida. Optimalni pH škropiva je 6,3. • Sredstva označena u programu s * nisu registrirana za primjenu u RH u ovoj kulturi, ali ih navodimo u programu temeljem iskustava u primjeni i dozvola za primjenu u drugim državama. 	

